


آبسه پری آنال یا آبسه مقعد:

به تجمع چرک ناشی از عفونت در اطراف مقعد . آبسه مقعد یا پری آنال گفته می شود . بسته شدن دهانه غده های نزدیک مقعد باعث تجمع چرک و عفونت شده و اطراف مقعد متورم می شود . در مردان و برخی بیماریهای گوارشی بیشتر دیده می شود . آبسه ممکن است در ناحیه سوراخ مقعدی یا به شکل عمقی در جدار راست روده تشکیل شود .

انواع آبسه مقعدی :

- 1- آبسه سطحی : شایعترین نوع آبسه مقعدی است . با درد زیاد در لبه مقعد همراه است . ناحیه آبسه گرم تر از دیگر نقاط است و قرمزی و التهاب در بافت های اطراف دیده می شود . نشستن و راه رفتن برای بیمار سخت است . گاهی آبسه باز و عفونت و خون از آن خارج می شود که باعث کاهش شدت درد می گردد .
- 2- آبسه عمقی : اگر چرک آبسه به عمق نفوذ کند انواع آبسه های عمقی را ایجاد می کند .



علائم و نشانه ها :

- درد شدید در ناحیه اطراف مقعد شایعترین شکایت می باشد که راه رفتن . سرفه کردن و زور زدن باعث شدت یافتن درد می شود .
- تب
- احتباس ادراری
- بی اشتها
- یبوست
- خروج خون و چرک

درمان :

جراحی (تخلیه آبسه):

بیشترین درمان در تمام انواع آبسه های سطحی و عمقی در ناحیه مقعد است که اکثراً موفقیت آمیز خواهد بود .

بهبودی آبسه آهسته است و زمان درمان آبسه بسته به سطح آبسه متفاوت است . اگر عارضه ای اتفاق نیفتد آبسه در عرض 6 ماه کاملاً بهبود می یابد .

عوارض آبسه :

1- فیستول از مهمترین عوارض آبسه است . فیستول یعنی ارتباط بین دو سطح بافت بدن (کانال مقعد و پوست اطراف)

2- عود آبسه در صورت عدم درمان عامل زمینه ساز

عوامل تشدید کننده :

- 1- ابتلا به بیماریهای گوارشی
- 2- آسیب ناشی از نوک وسیله تنقیه
- 3- هموروئید بیرون زده که درمان نشده است
- 4- بارداری
- 5- دیابت


آموزش به بیمار و خانواده :

1- محل تخلیه آبسه دوخته نشده و باز است . به تدریج حفره بسته شود . محل را با گاز تمیز خشک نگه دارید طبق دستور پزشک پانسمان تعویض شود ..



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

آبسه پری آنال (آبسه مقعد)



تهیه کننده:

فاطمه گلستانی (سوپروایزر آموزش سلامت)

پریسا حصاری (پرستار بخش جراحی عمومی)

زیر نظر: دکتر سید حسن سید شریفی کاخکی (متخصص)

جراحی عمومی

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

مرداد 1402



www.nkums.ac.ir



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره تلفنهای

زیر تماس بگیرید:

تلفن: 12-05832297010 داخلی 1186

09154415446

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

2- معمولا بعد از تخلیه آبسه نیاز به آنتی بیوتیک نیست مگر در صورت عفونت شدید و یا ضعف ایمنی یا دیابت و یا بیماری قلبی که باید آنتی بیوتیک مصرف شود.

3- چند ساعت بعد از عمل می توانید بنشینید و راه بروید.

4- در صورت درد از مسکن ساده مانند استامینوفن

می توانید استفاده کنید. در صورت درد شدید، تب، قرمزی در محل عمل حتما به پزشک مراجعه کنید.

5- پس از عمل تا هوشیاری کامل چیزی نخورید سپس کم کم غذاهای سبک مثل سوپ مصرف کنید.

6- بعد از ترخیص از غذاهایی که از یبوست جلوگیری

می کند استفاده کنید. این غذاها شامل سالاد و سبزیجات و میوه جات که همراه با غذای معمول استفاده می شوند.

7- بهتر است تا بهبودی کامل از توالی فرنگی استفاده نشود.

8- بعد از دفع مدفوع خود را با آب گرم بشوید.

9- پیاده روی را جز فعالیت های روزانه خود قرار دهید.

10- از مصرف صابونهای معطر خودداری کنید.