


اسپلنکتومی

طحال یک عضو داخل شکمی است که در سمت چپ قسمت فوقانی شکم کنار معده و بالای کلیه چپ قرار دارد. طحال کاملاً توسط دنده تحتانی قفسه سینه محافظت می شود و در حالت طبیعی نمی توان آن را از جدار شکم جدا کرد.

طحال در دوران مختلف زندگی وظایف کاملاً متفاوتی را به عهده می گیرد. در دوران جنینی و ماه ۵ و ۸ بارداری بعنوان یک عضو خونساز عمل می کند و گلبولهای سفید و قرمز را می سازد.

پس از تولد مغز استخوان بعنوان یک مرکز خونساز عمل می کند و این فعالیت طحال خاموش می شود اما وظیفه طحال کاملاً از بین نمی رود و در برخی از بیماریها که مغز استخوان، دیگر نمی تواند سلولهای خونی بسازد طحال مجدداً شروع به فعالیت می کند.



چه زمانی طحال برداشته می شود

❖ گاهی طحال عملکرد پاکسازی خون را بیش از حد لازم انجام می دهد و نه تنها سلولهای معیوب و فرسوده بلکه سلولهای سالم نیز از گردش خون حذف می کند. که این حالت با برداشتن طحال بهبود می یابد

❖ پارگی طحال در اثر ضربه یا تصادف

❖ در برخی بیماریهای خونی مثل کم خونی داسی شکل یا تالاسمی پیشرفته

تشخیص:

آزمایش خونی مثل cbc

آسپیراسیون مغز استخوان

سونوگرافی شکم

سی تی اسکن شکم

ام آر ای شکم

اسکن رادیوایزوتوپ طحال

برداشتن طحال:

- جراحی باز : برش جراحی روی شکم ایجاد شده و طحال خارج می شود

- لاپاراسکوپي : این نوع جراحی بسیار کم تهاجمی بوده و تنها چند برش کوچک در شکم ایجاد می شود و با لاپاراسکوپ وارد شکم شده و با استفاده از یک دوربین کوچک تصویر طحال نشان داده شده و با ابزار مخصوص طحال را خارج می کنند.

عوارض جراحی :

- عفونت
- ایجاد لخته خون
- خونریزی
- حساسیت به داروی بیهوشی
- حمله قلبی
- آتلکتازی و عفونت ریه

خودمراقبتی بعد از عمل جراحی :


- تعویض پانسمان طبق دستور پزشک انجام دهید.
- از بلند کردن اجسام سنگین تا ۳ ماه خودداری کنید.
- از زورزدن اجتناب کنید.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) شهرستان بجنورد

اسپلنکتومی [برداشتن طحال]



تهیه کننده :

فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزشی سلامت

بازنگری: آبان ۱۴۰۳

• از روبروسی با افراد سرماخورده و دارای عفونت شناخته

شده پیرهیزید

توجه :

افرادی که به هر علتی طحالشان برداشته می شود بدلیل اینکه طحال نقش قابل توجهی در سیستم ایمنی دارد باید واکسیناسیون مناسب انجام دهد و پیشگیری از احتمال وقوع عفونت به درستی صورت گیرد این افراد با اولین علائم مشکوک به عفونت حتی شبیه به سرماخوردگی بلافاصله به پزشک مراجعه کنند.



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۱۲-۰۵۸۳۲۲۹۷۰۱۰

۰۹۱۵۴۴۱۵۴۴۶

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس

زیر مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.ac.ir

• آب به اندازه کافی بنوشید.

• برای جلوگیری از روی هم خوابیدن ریه ها مرتباً

هر ۳-۴ ساعت تنفس عمیق داشته باشید

• دوش گرفتن بعد از ۴ روز بلامانع است.

• در صورت بروز خونریزی به پزشک خود مراجعه کنید

• برای جلوگیری از یبوست از غذاهایی که پرفیبر هستند استفاده کنید.

• در صورتی که تنگی نفس داشتید سریعاً به پزشک مراجعه کنید

• جهت پیشگیری از عفونت در صورت امکان ۲ هفته

قبل از عمل و یا تا ۲ روز بعد از عمل واکسن پنوموواکس

تزریق کنید.

• جهت پیشگیری از عفونت ریه با انجام سرفه موثر

با حمایت شکم ترشحات ریه را خارج کنید

• استفاده از آنتی بیوتیک تجویز شده در زمان مناسب

لازم است

• بعد از اجازه پزشک مایعات را شروع کنید و به مرور

غذاهای نرم و سپس معمولی استفاده کنید.