




بسمه تعالی

آمادگی و نحوه ی انجام رادیوگرافی IVP



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

دفتر آموزش سلامت

تاریخ بازنگری : پاییز ۱۴۰۴

❖ اگر حالت خارش و یا تنگی نفس به شما دست داد، بی درنگ

رادیولوژیست را خبر کنید؛ در این حالت برای شما واکنش

حساسیتی خفیف ناشی از تزریق ماده حاجب روی داده است

و ممکن است تزریق آنتی هیستامین برای شما ضروری باشد.

❖ اگر شما سابقه آلرژی شدید و یا آسم دارید، ممکن است

رادیولوژیست برای شما داروی استروئید تجویز کند و یا روش

بررسی شما را تغییر دهد، در این مورد رادیولوژیست با شما و

پزشکتان مشورت و بحث خواهد کرد.

❖ قبل از تزریق ماده حاجب، ما به شما اطلاعاتی راجع به ماده

حاجب خواهیم داد و از شما و یا بستگان موافقت نامه کتبی گرفته

خواهد شد. در این مورد هر سوالی دارید از تکنولوژیست

رادیولوژی رادیولوژیست بپرسید.

منبع: تکنیک های پرتو نگاری اختصاصی، فضل ا... تورچیان

نکاتی درباره مواد حاجب این آزمون:

❖ این آزمون نیاز به تزریق ماده حاجب وجود دارد. ماده

حاجب این آزمون به شکل محلول و اپاک به اشعه

ایکس است. با تزریق ماده حاجب کلیه ها تغلیظ شده و

قبل از اینکه از طریق ادرار از بدن خارج شود، به مثانه

راه پیدا می کند.

ماده حاجب بی رنگ بوده، بنابراین شما هنگام تخلیه

ادرار نمی توانید آنرا مشاهده کنید.

❖ در فاصله کوتاهی پس از تزریق ماده حاجب برخی از

بیماران، احساس گرم شدن و در مواردی احساس طعم

فلز در دهان به آنها دست می دهد. معمولاً این حالات

در ۱-۲ دقیقه اول از بین می روند و نیازی به اطلاع و

یا اقدامات پزشکی بعدی نیست.

رادیوگرافی IVP برای نمایش سیستم ادراری به کار می رود.

سیستم ادراری از کلیه ها، حالب ها (لوله ای حد واسط بین کلیه ومثانه) و مثانه تشکیل شده است.

توجه

*جهت انجام گرافی نیاز به تعیین وقت قبلی و انجام آزمایش اوره وکراتین دارید.

*دانستن وزن دقیق خود جهت تعیین میزان داروی حاجب ضروری است.

*اگر شما IVP قبلی،عکس ساده شکم، سونوگرافی ویا سی تی اسکن از کلیه انجام داده اید،عکس ویا گزارش آنها را با خودبیاورید.

*در صورتیکه خانم هستید از عدم بارداری اطمینان حاصل نمائید که باردار نباشید.

*در صورتیکه سابقه حساسیت دارویی یاغذایی دارید یا

بیماری خاصی مثل آسم، دیابت، هپاتیت، ایدز یا غیره دارید، قبلاً به اطلاع مسئول پذیرش رادیولوژی برسانید.

دستور آمادگی روده ای قبل از عکسبرداری:

داروهای لازم: ۴۰ گرم روغن کرچک

۴عدد قرص دیایمیتیکون

*روده باید از مواد دفعی، گاز و مدفوع تخلیه شده باشد. برای این منظور 24 ساعت قبل از انجام رادیوگرافی باید رژیم غذایی سبکی داشته باشید.

*مواد گازدار مثل نوشابه، دوغ و شیر مصرف نکنید.

*غذاهای سبک، کم حجم و کم فیبر و فاقد حبوبات مصرف کنید.

*بعد از نهار هر ۴ساعت یک عددقرص دیایمیتیکون بجوید.

*استفاده از مسهل روغنی مثل روغن کرچک یا لاکساریسن به میزان ۴۰گرم الزامی است.

*باید مسهل را حدود ساعت 6 یا 7 بعدازظهر قبل ازروز آزمون مصرف کنید و پس از آن از مصرف موادغذایی خودداری کنید.
*شام نخورید.

*می توانید روغن کرچک را همراه با شربت آبلیمو یا چای مصرف کنید.

چه کسی این آزمون را انجام می دهد؟

رادیولوژیست پزشک رادیولوژی تکنولوژیست رادیولوژی

در اتاق با شما همراه خواهند بود. آنها قبل از شروع به شما نحوه انجام آزمون را توضیح خواهند داد، در این مورد نیز تردید به خود راه ندهید و اگر چیزی را متوجه نشدید از آنها سوال کنید.

نحوه انجام رادیوگرافی IVP

*ابتدا یک عکس ساده شکم KUB انجام می شود.

تا آمادگی روده ای شما توسط پزشک رادیولوژیست تایید شود.

*این آزمون با تزریق ماده حاجب بداخل جریان خون از طریق ورید دست و توسط آنژیوکت انجام می گیرد.

*مدت زمان این آزمون از نیم ساعت و برحسب نیاز

عکس های تأخیری تا ۶ الی ۲۴ساعت هم بطول می انجامد.

*در آخر آزمون از شما تقاضا می شود که مثانه خود را خالی کرده و عکس دیگری از مثانه خالی گرفته میشود

بعد از اینکه رادیولوژیست عکس های شما را مشاهده

کرد و آزمون تمام شد، شما می توانید به منزل برگردید

و به حالت عادی بخورید و بیاشامید. ماده حاجب به

زودی از بدن شما خارج میشود و این در حالست که

موقع ادرار متوجه دفع آن نیستید.