



بسمه تعالی

آمادگی و نحوه ی انجام رادیوگرافی از روده بزرگ



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

دفتر آموزش سلامت

تاریخ بازنگری : پاییز ۱۴۰۴

*برخی افراد برای چند ساعت پس از آن کمی احساس ناخوشی می کنند.

*شما می توانید به طور طبیعی پس از هر آزمایش باریم غذا بخورید.

*باریم ممکن است باعث یبوست شما شود. بنابراین، برای کمک به برای یک روز یا بیشتر مایعات زیادی بنوشید تا باریم از دستگاه گوارش شما خارج شود.

*اگر شما بعد از سه یا چهار روز دفع مدفوع نداشتید به پزشک مراجعه کنید.

*باریم تا زمانی که کاملاً از روده ها خارج نشود (حدود یک تا سه روز بسته به عادت اجابت مزاج شما)، مدفوع شما را سفید و یا کمرنگ خواهد ساخت.

*باریم جذب بدن نمی شود. بنابراین، نادر است که آزمایش باریم باعث مشکلات و یا عوارض جانبی دیگری شود.

*گزارش گرافی شما ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد آماده میشود.

منبع: تکنیک های پرتو نگاری اختصاصی، فضل ا... تورچیان

شاید هم از شما خواسته شود در بعضی مواقع نفس

خود را حبس کنید.

*رادیولوژیست ممکن است روی شکم و لگن شما

فشار وارد کند تا تصاویر بهتری روی مانیتور متصل به

ماشین اشعه ایکس حاصل شود.

*به طور معمول، انجام تست باریوم انما ۳۰ تا ۶۰ دقیقه

به طول می انجامد .

*پس از اتمام کار، بیشتر باریوم از راه لوله انما از

کولون خارج می شود. زمانی که تیوب خارج شد، شما

می توانید هوا و باریوم باقی مانده را در توالت تخلیه

کنید. کرامپ های شکمی اغلب به سرعت پایان

می پذیرند و می توانید فعالیت های خود را از سر

بگیرید.

پس از انجام عکس برداری رادیوگرافی با باریم:

*شما بلافاصله پس از اتمام تست قادر به رفتن به خانه

می باشید.

*در این آزمایش، روده بزرگ توسط ماده حاجب مورد بررسی قرار می گیرد .

*جهت انجام گرافی نیاز به تعیین وقت قبلی دارید باید به

صورت حضوری مراجعه نموده و ضمن اخذ نوبت پزشک

رادیولوژیست داروهایی که برای انجام رادیوگرافی باریم انما

لازم است در نسخه شما نوشته و روز انجام آزمون داروها را

به همراه داشته باشید.

آمادگی روده ای

آمادگی روده ای در این آزمون بسیار مهم است زیرا تصویر

مواد دفعی باقی مانده در روده تشخیص پزشک رادچارمشکل

می کند.

*بیمارروز قبل از انجام تصویربرداری بعد از نهار (۴ عدد)

قرص دایمیتیکون هر ۴ ساعت یک عدد قرص دایمیتیکون
بجود.

*بیمار شب قبل شام سبک خورده (حدود ساعت ۷ شب) و

بعد معادل ۴۰ گرم روغن کرچک را با نصف لیوان آب گرم

مخلوط کرده و میل نماید .پس از آن چیزی نخورید .صبح روز

آزمایش ناشتا باشید.

*در مورد اورژانسی نیاز به آمادگی روده ای نیست.
*حضوریک همراه وداشتن یک دست لباس اضافه الزامی است.

برخی از نکات در مورد آزمایش رادیوگرافی با باریم:

*خانم ها از عدم بارداری خود اطمینان حاصل نمایند.

*بیمار محترم اگر در طی هفته اخیر تصویر برداری با ماده حاجب

انجام داده اید حتما به تکنسین رادیولوژی اطلاع دهید.

*حداقل یک هفته قبل از انجام تست، با پزشکتان در

موردداروهایی که به صورت طبیعی مصرف می کنید، مشورت

کنید. شاید از شما خواسته شود مصرف آنها را چند ساعت یا چند

روز قبل از انجام تست قطع کنید.

*اگر سابقه جراحی قبلی داریدبه تکنسین رادیولوژی اطلاع دهید.

*شرح حال کامل بیماری خود ودرصورت داشتن بیماری خاص

و یا استفاده از داروهای خاص به تکنسین رادیولوژی اطلاع دهید.

در طول انجام تست

*در طول انجام باریوم انما، شما یک گان خواهید پوشید و باید

عینک، هرگونه جواهرات یا بدلیجات و دندان مصنوعی همراه

نداشته باشید.

*از شما خواسته می شود روی یک تخت مخصوص و به
پهلوی بخوایید.

* در ابتدا یک تصویر اشعه ایکس گرفته می شود تا

مطمئن شوند که کولون تمیز است.

*سپس، یک لوله انمای لغزنده و روان درون رکتوم قرار

داشته می شود.

*کیسه باریوم به لوله متصل شده تا محلول باریوم وارد

کولون شود.

*اگر قرار است برای شما باریوم انمای دوبل کنتراست

انجام شود، هوا نیز از راه همان لوله به دورن کولون

فرستاده می شود.

***آرام باشید و نفس های بلند و عمیق بکشید.**

*گاهی از شما خواسته می شود تا برگردید و حالت های

مختلفی را روی تخت تست بگیرید. این کار کمک

می کند تا مطمئن شویم تمامی کولون با باریوم پوشیده

شده و رادیولوژیست می تواند کولون را از زاویه های

مختلف ببیند و ارزیابی کند.