



بسمه تعالی

سیستوارتروگرافی

VCUG



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

دفتر آموزش سلامت

تاریخ بازنگری : بهار ۱۴۰۴

*در صورت استفاده از داروی خاص به رادیولوژی اطلاع دهید.

*بیمار حتما سوندگذاری شده به رادیولوژی منتقل شود.

*حضور پرستار و یک همراهی الزامی است.

*یک دست لباس اضافه همراه بیاورید.

*داروهای لازم برای انجام گرافی توسط بخش رادیولوژی

تامین و در پرونده بیمار از طریق HIS ثبت میشود.

منبع: تکنیک های پرتو نگاری اختصاصی، فضل ا... تورچیان

نکات پرستاری

*پس از درخواست پزشک معالج با بخش

رادیولوژی جهت نوبت دهی هماهنگ شود.

*در صورت خانم بودن بیمار از عدم بارداری

اطمینان حاصل نمائید.

*اگر بیمار در طی هفته گذشته تصویربرداری با

ماده حاجب انجام داده به رادیولوژی اطلاع دهید.

*این گرافی احتیاج به آمادگی روده ای و ناشتایی

ندارد.

*درخواست گرافی در سیستم HIS ثبت شود.

*شرح حال بیمار در HIS ثبت شود.

این گرافی جهت بررسی برگشت ادرار از مثانه به حالب،

عفونت های مزمن دستگاه ادراری، ناهنجاریهای

مادرزادی مثانه، بی اختیاری ادراری، تنگی مجرای ادراری

صورت میگیرد.

قبل از انجام گرافی

*بیماران خانم از عدم بارداری خود اطمینان حاصل

نمایند.

*اگر بیمار در طی هفته گذشته تصویربرداری با ماده

حاجب انجام داده به رادیولوژی اطلاع دهید.

*این رادیوگرافی احتیاج به آمادگی روده ای و ناشتایی

ندارد.

*داروهایی که توسط پزشک رادیولوژیست درخواست

داده شده تهیه نمایید.

*اگر بیمار از داروی خاص استفاده می کند و یا به ماده

حاجب حساسیت دارد، پزشک را در جریان قرار دهید.

*پزشک رادر جریان بیماریهای اخیر و یا شرایط پزشکی

ودرمانی دیگر بگذارید.

*سونوگرافی یا تصویربرداری های اخیر خود را همراه داشته

باشید.

*داشتن یک همراه و یک دست لباس اضافه الزامی می باشد.

*این روش با استفاده از اشعه X انجام می شود و چون اشیای

فلزی روی تصویر تاثیر می گذارد، لازم است از پوشیدن

لباس های زیپ دار و یا گیره دار خودداری شود.

*بیمار باید تحت شرایط کاملاً استریل سوند گذاری شود.

(سوند مثانه)

حین انجام گرافی

ابتدا یک عکس ساده شکم گرفته می شود .

سوند مسدود میشود و پس از آن از طریق سوند

ماده حاجب رقیق شده متناسب با بیمار وارد مثانه

شده و تصویربرداری درپوزیشنهای مناسب صورت

میگیرد.

پس از آن سوند بیرون کشیده میشود و درحین

ادرار از بیمار گرافی تهیه میشود.

پس از انجام گرافی

بعد از اتمام این آزمایش ممکن است فرد احساس

سوزش ادرار داشته باشد که بهتر است برای

جلوگیری از این عارضه مصرف مایعات را بیشتر

کنید .

سوزش ادرار نباید طولانی مدت باشد و بعد از

گذشت یک روز برطرف خواهد شد.