

مالاریا :

یکی از شایع ترین بیماریهای منتقله توسط ناقلین در کشور می باشد که بعلت حضور انگل پلاسمودیوم در خون انسان ایجاد می شود . پلاسمودیوم ها در داخل گلبول های قرمز خون رشد می کنند و پس از رشد تکثیر نموده و موجب پاره شدن گلبولهای قرمز خون و بروز علائم مالاریا می شود .

همه گیرشناسی :

بیشترین موارد بیماری مالاریا در ایران مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان , هرمزگان و قسمت گرمسیری کرمان می باشد .

ناقل بیماری . پشه آنوفل ماده می باشد . در کشور ایران ۱۹ گونه پشه آنوفل شناخته شده که ۷ گونه ی آن ناقل بیماری می باشد . پشه های آنوفل بیشترین زمان خونخوری را در شب انجام می دهند .

دوره کمون :


دوره کمون برحسب انگل متفاوت است و از ۷ الی ۱۴ روز می تواند متغییر باشد .

روش تشخیص :

ساده و مطمئن ترین روش تشخیص قطعی بیماری آزمایش خون می باشد .

راه انتقال :

رایج ترین روش انتقال بیمار از طریق گزش پشه آنوفل ماده از شخص بیمار به شخص سالم است.



علائم بیماری :

اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می شوند ابتدا احساس سرما می کنند سپس لرز می نمایند و بعد دچار تب می شوند و در نهایت عرق می کنند که به این مرحله . حمله مالاریا گفته می شود .

علائم دیگر شامل

- سردرد
- استفراغ
- بزرگی طحال
- کم خونی و دردهای عضلانی می باشد .



عوارض بیماری:

تورم مغز که می تواند باعث تشنج و کما و نهایتا مرگ شود.

اختلالات تنفسی

نارسایی کلیه و کبد

کم خونی و کاهش قندخون

درمان : طبق دستورالعمل کشوری درمان اساسی با کلروکین و پریماکین توصیه می شود.

اقدامات پیشگیرانه:

- ۱- رعایت بهداشت و توجه به علائم و راههای انتقال بیماری
- ۲- قطع زنجیره انتقال بیماری و پیداکردن سریع مخازن آلوده و درمان به موقع و کامل آن نقش مهمی در کنترل بیماری دارد .



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

بیماری مالاریا و راه های پیشگیری



تهیه کننده:

فاطمه گلستانی (سوپروایزر آموزش سلامت)

سیده وحیده هاشمی (پرستار)

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

تابستان ۱۴۰۴



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره تلفنهای

زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.ac.ir

۳- جلوگیری از گزش توسط پشه ی آنوفل با اقدامات زیر:

- خوابیدن در زیر پشه بند در موقع شب
- استفاده از توری مناسب برای پنجره ها و درب های خانه یا حداقل اتاق هایی که افراد . شب در آنجا می خوابند.
- استفاده از مواد دور کننده حشرات بر روی نقاط باز بدن
- استفاده از حشره کشهای خانگی بصورت اسپری در محل های استراحت قبل از خواب .
- از بین بردن محل های تکثیر پشه آنوفل
- از بین بردن و خشکاندن آبهای راکد
- جاری کردن و به حرکت درآوردن آبهای راکد و پرکردن
- استفاده از ماهی های لارو خوار و باسیل های لارو کش شیمیایی در داخل آبهایی که می تواند محل مناسب جهت تخم گذاری پشه های آنوفل باشد.
- از بین بردن پشه های بالغ با استفاده از حشره کش های شیمیایی طولانی اثر