

مراجعه کننده عزیز


در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با آمبولکتومی (برداشتن لخته) به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ و بهبود بخشید.

آمبولکتومی چیست؟

آمبولی عبارت است از انسداد قسمتی از رگ یا یکی از شاخه های آن بوسیله لخته خون، که این لخته بوسیله جریان خون از محل ایجاد شده به عروق کوچکتر حمل میشود تا جایی که سبب انسداد (بسته شدن) جریان خون می شود.


آمبولکتومی به عمل برداشتن لخته خونی از داخل رگ گفته می شود.

این لخته به دلایل مختلفی مانند عدم تحرک بیمار، عدم رعایت رژیم دارویی، رژیم غذایی نامناسب، ارث و غیره به وجود می آید.




علائم

علائم آمبولی شریانی به طور عمده به اندازهی آمبولی، ارگان درگیر و وضعیت عروق جانبی بستگی دارد. اثر فوری آن قطع جریان خون به ناحیه ی دور است. انسداد می تواند در قسمت بالا و پایین انسداد پیشرفت کند. اسپاسم (گرفتگی) ثانویهی عروقی می تواند به ایسکمی بیانجامد. ممکن است آمبولی تکه تکه شده و یا ترک خورده و موجب انسداد عروق کوچکتر دورتر گردد. آمبولی بیشتر در محل دو شاخه شدن شریان ها و مناطق باریک شده به دلیل تصلب شرائین به وجود می آید.



درمان


علاوه بر درمان دارویی خارج کردن لخته به دو روش جراحی باز یا بسته انجام می شود. انتخاب نوع روش بر اساس شرایط لخته، شرایط بیمار و صلاحدید پزشک است.





دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

آمبولکتومی (برداشتن لخته)



تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.ac.ir

پس از عمل

ممکن است پس از اتمام عمل به بخش آی سی یو منتقل شوید.

- در این بخش سطح اکسیژن و تمام علائم حیاتی شما مرتب چک می شود.
- پس از اینکه وضعیت شما به اندازه کافی تثبیت شد با دستور پزشک از بیمارستان ترخیص خواهید شد.
- جهت بهبود زخم‌تان از رژیم غذایی پر پروتئین (نخود، لوبیا، عدس و گوشت) و سرشار از ویتامین (سبزیجات و میوه ها) استفاده کنید.
- همچنین مصرف میوه و سبزی ها را به دلیل غنی بودن از املاح و ویتامین ها و از طرفی جهت جلوگیری از یبوست (یعنی کار نکردن شکم یا دفع سخت همراه با فشار مدفوع) در رژیم غذایی خودتان قرار دهید.

پیشگیری از عود مجدد

- ورزش‌های سبک مانند پیاده‌روی انجام دهید.
- وزن خود را در حالت متناسب حفظ نمایید.
- سیگار نکشید
- از استرس دوری کنید.