


نکات مهم بعد از جراحی

پس از عمل جراحی تا زمانی که به خوبی قادر به نشستن و خوردن مایعات و مواد غذایی از طریق دهان باشید سرم داده می‌شود.

این احتمال وجود دارد که شما یک کبودی را در اطراف منطقه عمل تجربه کنید.

کمی بعد از عمل سوند مثانه برداشته می‌شود. به تدریج راه رفتن را شروع می‌کنید و زمانی که به اندازه کافی حال عمومی مناسب داشته باشید مرخص خواهید شد.

ممکن است طبق صلاحدید پزشک مربوطه داروی آسپرین (یا در بعضی موارد داروی ضد انعقاد خون) به شما داده شود تا خطر انسداد پیوند شما کاهش یابد.



نکات مهم قبل از جراحی

معمولا قبل از جراحی پیوند رگ، تعدادی آزمایش وجود دارد که باید انجام شود.

۱-آزمایش خون

۲-نوار قلب (نظارت بر فعالیت الکتریکی قلب)

۳- آنژیوگرافی یا سی تی آنژیو از شریان مسدود شده

۴. حتما با پزشک خود در مورد داروهایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید مشورت کنید زیرا ممکن است لازم باشد قبل از عمل، مصرف آنها را قطع کنید.



مراجعه کننده عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با بای پس (پیوند) شریان به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ و بهبود بخشید.

بای پس (پیوند) شریان چیست؟

بای پس (پیوند) نوعی عمل جراحی برای دور زدن قسمت مسدود شده شریان با استفاده از یک قطعه رگ خونی دیگر است.


در این روش از رگهای خونی جهت میانبر زدن یا به اصطلاح بای پس سرخرگ دچار تنگی و گرفتگی استفاده میشود. در شرایط جدید جریان خون از رگهای خونی جدید به جای رگ های دچار تنگی یا انسداد قبلی صورت میگیرد.

این جراحی ممکن است با توجه به شریان درگیر در هر قسمت از بدن انجام شود.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

بای پس (پیوند) شریان



© Healthwise, Incorporated

تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

عوارض

در هر عمل جراحی بزرگی یک عارضه پزشکی مانند حمله قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیه، مشکلات قفسه سینه، از بین رفتن گردش خون در پاها یا روده یا عفونت در محل عمل می تواند رخ دهد. هر یک از این موارد نادر است.

پزشکان و پرستاران سعی خواهند کرد از بروز این عوارض جلوگیری کنند و در صورت بروز آنها به سرعت درمان انجام می شود.

مراقبت در منزل

➤ در ویزیت درمانگاه بعد از عمل زخم شما بررسی و بخیه ها کشیده می شود.

➤ در صورت وجود تورم یا ترشح از زخم، لطفاً با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

➤ سه روز بعد از عمل می توانید به طور عادی حمام کنید.

➤ در ابتدا از بلند کردن اجسام سنگین و کشش مکرر خودداری کنید. ورزش منظم مانند پیاده روی کوتاه، همراه با استراحت، برای چند هفته اول بعد از عمل توصیه می شود.