

مراجعه کننده عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشد.

ونوگرافی چیست؟

ونوگرافی یک روش تشخیصی برای شناسایی و یافتن لخته های خون یا یافتن رگ جهت دسترسی دیالیز و یا ارزیابی رگهای واریس قبل از عمل استفاده میشود

روش انجام ونوگرافی چیست؟

پزشک شما احتمالاً این معاینه را به صورت سرپایی انجام می دهد
ونوگرام در بخش اشعه ایکس بیمارستان انجام می شود .

شما روی یک میز اشعه ایکس دراز خواهید کشید. بسته به بیماری که دارید قسمتی از بدن مورد بررسی قرار می گیرد

پزشک برای تزریق ماده کنتراست یک سوزن یا سوند را در ورید قرار می دهد. در جایی که آن سوزن قرار دارد بستگی به بیماری شما دارد که رگها در آن ارزیابی می شوند

. از آنجا که مواد کنتراست در رگهای مورد بررسی قرار

می گیرند، ممکن است شما به موقعیت های مختلف منتقل شوید تا اشعه ایکس بتواند از زوایای مختلف از رگهای شما عکس بگیرد.

همانطور که ماده حاجب از بدن شما عبور می کند، ممکن است احساس گرما کنید. این به سرعت می گذرد.

ممکن است طعم فلز در دهان خود داشته باشید. دست یا پای شما ممکن است احساس کند که در حال بی حس شدن یا خواب رفتن است. پس از اتمام آزمایش، این احساس از بین می رود

ونوگرافی بین ۳۰ تا ۹۰ دقیقه طول می کشد
سرم تراپی برای شما انجام میشود تا ماده حاجب را از رگ های شما خارج کند. همچنین به شما دستور داده می شود که برای روز بعد مایعات زیادی بنوشید. پس از برداشتن کاتتر، بانداز در محل IV قرار داده می شود. سپس شما را برای هر گونه علائم عارضه، مانند خونریزی از محل تزریق، عفونت یا واکنش آلرژیک تحت نظر قرار خواهند داد.

در این معاینه معمولاً از یک صفحه رادیوگرافی، یک یا دو لوله اشعه ایکس و یک مانیتور ویدیویی استفاده می کند.فلوروسکوپی اشعه ایکس را به تصاویر ویدئویی تبدیل می کند.

پزشکان از آن برای مشاهده و راهنمایی روش ها استفاده می کنند.

این روش ممکن است از تجهیزات دیگری مانند خط داخل وریدی (IV)، دستگاه سونوگرافی و دستگاههایی که ضربان قلب و فشار خون شما را کنترل می کنند، استفاده کند.

برخی از خطرات احتمالی چیست؟

در صورت استفاده از تزریق ماده حاجب، خطر واکنش آلرژیک بسیار جزئی وجود دارد.
در موارد نادر، ونوگرام می تواند باعث ترومبوز ورید عمقی (لخته شدن خون) شود.
خطر آسیب به کلیه ها با تزریق ماده حاجب وجود دارد. بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه (کلیه) باید قبل از دریافت مواد حاجب مبتنی بر ید توسط ورید یا شریان مورد توجه ویژه قرار گیرند. چنین بیمارانی در معرض خطر ابتلا به نفروپاتی ناشی از ماده حاجب هستند که در آن آسیب کلیوی از قبل موجود بدتر می شود.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

ونوگرافی



تهیه کننده: فاطمه گلستانی
سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

آمادگی قبل از عمل:

* به غیر از داروها ، پزشک شما ممکن است به شما بگوید که چند ساعت قبل از عمل چیزی نخورید یا ننوشید

* پزشک ممکن است به شما اجازه دهد در روز عمل مایعات شفاف بنوشید

* در مورد تمام داروهایی که مصرف می کنید به پزشک خود بگویید. هرگونه آلرژی ، به خصوص مواد حاجب را لیست کنید.

* در مورد بیماری های اخیر یا سایر شرایط پزشکی به پزشک خود بگویید.

* زنان باید در صورت بارداری به پزشک و تکنسین خود بگویند.

* پزشکان در دوران بارداری آزمایش های زیادی را انجام نمی دهند تا از قرار گرفتن جنین در برابر پرتودرمانی جلوگیری کنند.