

مراجعه کننده عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با کاتتر پورت به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشد.

کاتتر ورید مرکزی یا پورت جهت شیمی درمانی چیست؟

گاهی اوقات دستگاهی به نام پورت در زیر پوست شما طی یک عمل جراحی کوچک قرار می گیرد.

موارد استفاده از کاتتر ورید مرکزی:

۱- استفاده از داروها یا انتی بیوتیک برای مدت طولانی

۲- استفاده از داروهای سرطان

۳- در بیماران که دچار سوء تغذیه هستند جهت تغذیه وریدی استفاده میشود.

گذاشتن پورت :

ممکن است شما در اتاق عمل بیهوش شوید و یا اینکه فقط از داروی بیحسی برای شما استفاده شود تا شما احساس درد نکنید و طی عمل جراحی جزئی در زیر پوست سینه شما پورت قرار بگیرد.

بعد از قرار دادن پورت شما می توانید به منزل بروید.

ممکن است چند روز بعد از عمل محل عمل کمی دردناک باشد.

پس از بهبودی به پورت نباید صدمه وارد شود.



مراقبت از پورت:

پورت شما ۳ قسمت دارد

۱- مخزن یا کیسه ای از فلز سخت یا پلاستیک

۲- قسمت سیلیکونی جایی که سوزن در مخزن وارد می شود.

۳- لوله یا سوند که دارو را از مخزن به رگ بزرگ یا قلب منتقل می کند.



• برای دریافت دارو از طریق پورت یک فرد آموزش دیده سوزن مخصوصی را از طریق پوست شما بالای سیلیکون و داخل مخزن وصل می کند.

برای کاهش احساس درد میتوان از بیحسی موضعی استفاده کرد.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

پورت جهت شیمی درمانی



تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

- از پورت شما در خانه یا بیمارستان استفاده می شود.
- در هنگام استفاده از پورت برای جلوگیری از عفونت از یک پانسمان استریل استفاده کنید.
- برای جلوگیری از لخته شدن ماهی یکبار پورت، توسط پرستار شستشو داده شود.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنید:

- در صورتی که پورت دچار عفونت شدید شده باشد.
- در صورتی که پورت جابجا شده است.
- در صورتی که اطراف پورت قرمز یا متورم می باشد.
- در صورتی که تب بالای ۳۸ درجه داشته باشید.