

مراجعه کننده عزیز:

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با مراقبت از کاتتر همودیالیز به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ و بهبود بخشید.

کاتتر همودیالیز چیست

یکی از انواع دسترسی عروقی ، کاتتر ورید مرکزی جهت همودیالیز است که به صورت قرار دادن یک لوله پلاستیکی از طریق پوست دریکی از رگ های اصلی بدن است. به وسیله کاتتر می توان رفت و برگشت خون از بدن به دستگاه دیالیز را جهت تصفیه فراهم نمود.

عملکرد دیالیز در بدن

در نبود کلیه، ماشین دیالیز مواد زائد مثل نمک و آب اضافی و تولیدات سمی را از بدن دفع می کند.

مراقبت از کاتتر

➤ پانسمان کاتتر ۳ بار در هفته پس از انجام دیالیز در همان مرکز تعویض گردد و در غیر آن نیاز به تعویض پانسمان نمی باشد .

➤ در صورت خیس یا خونی شدن پانسمان در فواصل دیالیز پانسمان باید به روش استریل عوض شود.

➤ سرپوشهای کاتتر همیشه باید بسته باشد و فقط توسط پزشک یا پرستار به منظور اتصال به دستگاه دیالیز باز شود.

➤ از وارد آمدن ضربه و یا ایجاد کشش به کاتتر بپرهیزید.

➤ در صورت جابه جا شدن کاتتر، آن را به جلو یا عقب حرکت ندهید و با پانسمان محکم در محل ثابت نگهدارید و به پزشک مراجعه کنید.

➤ بست های کاتتر غیر از زمان دیالیز باز و بسته نشود (فقط توسط پزشک یا پرستار).



➤ اگر بخیه کاتتر باز یا کنده شد، در صورتی که کاتتر شما از نوع موقت است ، باید مجددا بخیه شود ولی در صورتی که کاتتر نوع دائمی باشد معمولاً نیاز قطعی به بخیه مجدد نیست. به هر صورت باید با پزشک خود مشورت نمایید.

➤ از هرگونه خم شدن لوله های کاتتر جلوگیری کنید. در صورت خروج کاتتر از محل، فوراً یک پانسمان فشاری روی آن بگذارید و به پزشک معالج خود و یا اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید از هر گونه دستکاری پرهیز نمایید.

➤ در صورت خونریزی از محل کاتتر پانسمان فشاری گذاشته و به پزشک معالج و یا اورژانس مراجعه کنید.

➤ استحمام بلامانع است، فقط قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب غوطه ور شود.


➤ شستشوی محل کاتتر با اسفنج حجیم خیس در هفته های اول و با ریختن آب برروی آن در هفته های بعد بلامانع است.

➤ زمان استحمام باید تا حد امکان کوتاه باشد.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

مراقبت از کاتتر همودیالیز



تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.ac.ir

➤ برای استحمام بهتر است به صورت ترتیبی هر ناحیه را شستشو دهید تا آب کمتری به سمت کاتتر سرازیر شود.

➤ در صورتی که کاتتر از محل خود خارج گردید به هیچ عنوان دستکاری یا سعی در برگرداندن آن به محل اولیه نکنید فقط بلافاصله به پزشک معالج مراجعه نمایید.

➤ در صورت تب و لرز و قرمزی پوست اطراف کاتتر،

سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

➤ کاتتر از نوع موقت جز با نظر پزشک نباید بیش از سه هفته استفاده شود و کاتتر موقت بیماران باید هر چه سریعتر خارج شود و یک دسترسی جدید ایجاد شود ، لذا در صورت داشتن کاتتر موقت هر چه سریعتر به پزشک خود برای تعبیه یک راه دسترسی عروقی دائمی مراجعه نمایید.

➤ اگر دیالیز شما به هر علتی قطع شد ولی کاتتر را به صلاحدید پزشک خود نگه داشته اید ، حتما در یک مرکز درمانی چند بار در هفته لوله های کاتتر را هپارینه کنید تا از لخته شدن خون در کاتتر و انسداد لوله ها جلوگیری شود.