

آبسه دندان :

آبسه دندان یا عفونت لثه نشان دهنده تجمع چرک است که داخل دندان ها یا لثه ها تشکیل می شود. آبسه معمولاً ریشه در عفونت باکتریایی دارد و اغلب در ناحیه نرم پالپ دندان مشاهده می شود با ترکیب مواد غذایی و باکتری های موجود در دهان بر روی دندان ها پلاک ایجاد می شود و پلاک با چسبیدن به دندان می تواند به آن آسیب زده و سطح آن را تخریب کند.

سه نوع اصلی آبسه دندان وجود دارند که عبارتند از :

- لثه: آبسه لثه در کودکان و بزرگسالان فقط بافت لثه را تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیری بر روی دندان یا بافت بین دندانی ندارد.



- پرپودنتال: این نوع آبسه لثه از ساختارهای بافت استخوانی نگهدارنده دندان ها شروع می شود.



- پری آپریکال: این نوع آبسه از بافت نرم پالپ دندان آغاز می گردد.



علائم و نشانه ها

علامت اصلی درد است :

- درد در ناحیه آسیب دیده در زمان جویدن غذا
- دردناک بودن ناحیه آسیب دیده در صورت لمس آن
- حساسیت به غذاها و نوشیدنی های سرد یا گرم
- وجود مزه بد در دهان بیمار (بوی بد دهان)
- تب کردن

• ناراحتی عمومی (بیمار معمولاً احساس ناخوشی دارد)

• تریسموس که در نتیجه آن باز و بسته کردن دهان دشوار می شود

دیسفاژی یا مشکل در بلع غذا

- بی خوابی

علت عفونت دندان:

عفونت دندان در اکثر مواقع مربوط به ایجاد عفونت در دندان است. در این حالت باکتری ها باعث ایجاد عفونت دندان می شوند. میکروبهایی موجود در پلاک دندانی سبب التهاب لثه ها خواهند شد. که باعث فاصله لثه از دندان میشود و فضایی بنام پاکت پرپودنتال در حد فاصل دندان و لثه تشکیل می شود و در فضای پاکت دندانی به دام می افتد. پلاک دندانی که در این فضا قرار گرفته است، با برنامه روتین بهداشت دهان و دندان زدوده نخواهد شد و نیاز به جرم گیری دندان می باشد.

❖ اگر بیماری لثه درمان نشود، پیشرفت می کند و به لقی دندان و ازدست رفتن دندان و استخوان خواهد انجامید.

تشخیص

۱- معاینه توسط دندانپزشک یا جراح فک و صورت

۲- عکسبرداری از دندان

راه و روش های درمان

۱- شکافتن

درمان آبسه نیازمند ایجاد شکاف (بریدگی) در کیسه چرک (محل تجمع باکتری) و خارج کردن مایع از آن است. به منظور انجام این کار از داروی بی حسی برای تسکین درد دندان بیمار استفاده می شود.


۲- عمل جراحی

بیماران مبتلا به آبسه پری آپریکال و عفونت عود کننده ممکن است نیاز به انجام عمل جراحی برای برداشتن بافت آسیب دیده داشته باشند. از طرف دیگر افراد مبتلا به آبسه پرپودنتال و عفونت عود کننده مربوط به آن ممکن است نیاز به تغییر شکل بافت لثه و حذف حفره پرپودنتال داشته باشند. در صورتی که پس از درمان آبسه دندان و پس از عمل جراحی آبسه دوباره عود کند، ممکن است دندان آسیب دیده برای درمان مشکل کشیده شود.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

آبسه دندان ولته



تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت

هانیه حق خواه (دانشجوی پرستاری)

زیر نظر:

دکتر زهرا صابری کریمان (جراح و متخصص ENT)

بهار ۱۴۰۴



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره تلفنهای

زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.ac.ir

درمان درد

آسپیرین، ایبوپروفن یا تیلنول (پاراسیتامول) همگی داروهای مسکن ضد درد هستند. با این وجود باید توجه کرد که مصرف بعضی داروها برای همه افراد بیمار مناسب نیستند. برای مثال:

اگر بیماری تنگی نفس دارید از ایبوپروفن استفاده نکنید. اگر زخم معده یا سابقه این بیماری دارید، از مسکن ایبوپروفن استفاده نکنید.

از آسپیرین برای کودکان زیر ۱۶ سال استفاده نکنید. در صورت بارداری یا شیر دهی داروی آسپیرین مصرف نکنید. فعالیت هایی که خود شما در این رابطه می توانید انجام دهید به شرح زیر هستند:

از مصرف غذاها و نوشیدنی های سرد خودداری کنید
از مصرف غذاها و نوشیدنی های گرم خودداری کنید
اطراف ناحیه آسیب دیده را نخ دندان نکشید
از یک مسواک بسیار نرم برای مسواک زدن استفاده کنید.
از آنتی بیوتیک ها می توان برای جلوگیری از پخش شدن عفونت استفاده کرد مثال : آموکسی سیلین یا مترونیدازول

عوارض جانبی:

۱- تشکیل کیست دندان

۲- استئومیلیت

۳- ترومبوز سینوس کاورنوس

۴- آنژین لودویگ

۵- سینوزیت ماکزیلاری