

پورت :

دستگاهی است که از یک لوله رگ گذار و یک مخزن برای تزریق دارو تشکیل شده است و دسترسی به یک سیاهرگ مرکزی را در بدن بیمار فراهم می سازد .

یکی از مشکلات عمده بیمارانی که نیاز به تزریقات مکرر دارند سوراخ نمودن رگهای مختلف و به تدریج نازک شدن آنها و نهایتا مسدود شدن رگها می باشد .


این امر علاوه بر درد و ناراحتی برای بیمار موجب تخریب رگهای محیطی و مشکلات جدیدی برای بیماران می شود . بخشی از پورت که زیر سطح پوست قرار دارد به پرسنل پزشکی این امکان را می دهد که بدون نیاز به نصب یک کاتتر بیرون از بدن و به جهت کاهش مشکلات جانبی از جمله عفونت بتوانند دارو و مایعات تزریقی را تجویز کنند .



پورت گذاری :

پس از بی حسی موضعی و یا بیهوشی لوله در داخل رگ مرکزی قرار داده می شود . سپس براساس اندازه پورت برشی برروی پوست ایجاد می شود که معمولا در ناحیه قفسه سینه می باشد و محفظه پورت زیر پوست کاشته می شود و پوست توسط بخیه دوخته می شود .

پورت را می توان برای هفته ها ماهها و حتی سالها حفظ نمود.



مراقبتهای بعد از پورت گذاری :

هفته اول ممکن است درد خفیف و کبودی را در محل شکاف تجربه کنید . جهت رفع این درد مصرف مسکن ساده مانند استامینوفن به شما کمک خواهد کرد .

- بعد از پورت گذاری به مدت ۵ روز آنتی بیوتیک خوراکی تجویز می شود که برای پیشگیری از عفونت می باشد .
- بعد از گذاشتن پورت مقداری داروی ضد انعقاد خون (هپارین) به داخل پورت تزریق می شود تا از لخته شدن خون داخل پورت جلوگیری شود .
- اگر بطور منظم از پورت استفاده نشود لازم است ماهیانه داخل پورت شستشو داده شود.
- بعد از یک هفته در صورت باقی ماندن قرمزی و تورم اطراف محل پورت حتما به پزشک مراجعه کنید .
- می توان در صورت صلاحدید پزشک معالج بلافاصله بعد از تعبیه از پورت استفاده کرد .





دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

آموزش مراقبت از پورت



تهیه کننده :

فاطمه گلستانی (سوپروایزر آموزش سلامت)

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بازنگری : بهار ۱۴۰۴



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.ac.ir

علائم هشدار:

- ایجاد مشکل هنگام تزریق
- ایجاد مشکل هنگام کشیدن خون از پورت
- سرباز کردن پوست محل پورت
- احساس درد و سوزش در محل پورت
- بروز تب
- تغییر رنگ پوست اطراف پورت
- نشت مایع ، خون و یا چرک از محل پورت
- درد کتف سمت محل پورت
- قرمزی محل پورت
- تپش قلب و تنگی نفس ناگهانی

نکات مورد توجه در نگهداری از پورت :

* همیشه قبل از دست زدن به محل پورت دستان خود را بشویید .

* محل پورت را هر روز بررسی کنید.

* لازمست در فواصل زمانی مشخص به داخل پورت یک داروی جلوگیری کننده از لخته شدن خون بنام هپارین تزریق شود و بطور منظم با سرم نمکی استریل شستشو شود که این کار توسط پرستار مجرب انجام شود .

